

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๘๙๙๒



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้วัคซีนโควิด 19 เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๑ เข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้น (เข็มที่ ๓) ในเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรง

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี ดังนี้

๑. ให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี ได้ทุกสูตรที่ได้รับการรับรองทางวิชาการ โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก และบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๑ เข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้น ภายใต้วัดขึ้นคงคลังที่มีอยู่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. ให้ตรวจสอบวันหมดอายุของวัคซีน และเร่งฉีดโดยเร็วก่อนวัคซีนหมดอายุ
๓. ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในประชากรทั้งสัญชาติไทยและมีเชื้อสัญชาติไทย
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เข้ารับวัคซีนโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖

คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี ของกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 จัดเป็นเข็มที่ 1, 2 และเข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 - 17 ปี

- พิจารณาภายใต้
1. คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกัน
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพผลการใช้วัคซีนตามที่ได้รับกรจริงในประเทศ (Real-world vaccine effectiveness) ร่วมกับ
 3. เจตนาในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
 4. ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

| | เข็มที่ 1 | ระยะห่างระหว่างเข็ม | เข็มที่ 2 | ระยะห่างระหว่างเข็ม | เข็มที่ 3 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| ผู้ที่มีอายุ 5 - 6 ปี | Pfizer ฝาสีส้ม | 8 สัปดาห์ | Pfizer ฝาสีส้ม | | ยังไม่ถึงกำหนด |
| ผู้ที่มีอายุ 6 - 11 ปี | Pfizer ฝาสีส้ม Sinovac | 8 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ | Pfizer ฝาสีส้ม Pfizer ฝาสีส้ม | | ยังไม่ถึงกำหนด ยังไม่ถึงกำหนด |
| ผู้ที่มีอายุ 12 - 17 ปี | Pfizer ฝาสีม่วง Sinovac | 3 - 4 สัปดาห์* 4 สัปดาห์ | Pfizer ฝาสีม่วง Pfizer ฝาสีม่วง | 4 - 6 เดือน 4 - 6 เดือน | Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส / ครึ่งโดส** Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส |
| ผู้ที่มีอายุ 6 - 17 ปี | Sinovac/Sinopharm | 4 สัปดาห์ | Sinovac/Sinopharm | 4 สัปดาห์ | Pfizer ฝาสีส้ม / ฝาสีม่วง เต็มโดส ตามช่วงอายุ |

แนะนำให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 ได้ตามหลักการเดียวกันกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน

หมายเหตุ * ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำระยะห่าง 8 สัปดาห์

** ผู้ที่รับวัคซีน Pfizer ฝาสีม่วงครบ 2 เข็ม สามารถเลือกรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงขนาดครึ่งโดสหรือเต็มโดสได้ โดยให้เป็นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก

ทั้งนี้หากประสงค์รับผ่านระบบสถานศึกษาจะเป็นการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงครึ่งโดส สำหรับกลุ่มอื่น ๆ ให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงเต็มโดสผ่านระบบสถานพยาบาล

ผู้ที่มีเงื่อนไขเฉพาะ มีความจำเป็น หรือ มีข้อจำกัดในการรับวัคซีนตามแนวทางการฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ให้หน่วยบริการพิจารณาฉีดวัคซีนตามดุลยพินิจของแพทย์

ภายใต้หลักวิชาการ คำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565