

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/๒๓๐๖



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ และยังมีภาวะอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้วัคซีนโควิด 19 เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนไทย จากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น การให้วัคซีน Moderna รวมถึงระยะห่างการให้วัคซีนโควิด 19 และวัคซีนอื่น ๆ

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดังนี้

#### ๑. การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น

๑.๑ กำหนดให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๓ เข็ม เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันให้เพียงพอต่อการป้องกันความรุนแรงของโรค

๑.๒ เพื่อประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและความรุนแรงของการเกิดโรค

๑.๒.๑ ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่ม ๖๐๘ และผู้มีความเสี่ยงอื่น ๆ แนะนำให้รับเข็มกระตุ้น (หลังเข็มที่ ๓ เป็นต้นไป) โดยมีระยะห่างจากเข็มสุดท้ายตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป

๑.๒.๒ ในกรณีประชาชนทั่วไปสามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น (หลังเข็มที่ ๓ เป็นต้นไป) ได้เช่นกัน โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจและความจำเป็นอื่น ๆ ตามดุลพินิจของแพทย์

๒. กำหนดให้วัคซีนโควิด 19 สามารถให้พร้อมกับวัคซีนอื่น ๆ ในวันเดียวกันได้หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ ยกเว้นการฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิด Viral Vector (AstraZeneca) ร่วมกับการฉีดวัคซีนเชื้อเป็น (เช่น วัคซีน MMR, LAJE, Varicella, Hepatitis A และ Herpes Zoster) ให้ใช้หลักการระยะห่างของวัคซีนเชื้อเป็น และวัคซีนเชื้อเป็น คือ หากไม่สามารถให้พร้อมในวันเดียวกัน ควรเว้นระยะเวลาให้ห่างอย่างน้อย ๒๘ วัน

๓. แนวทางการให้วัคซีน Moderna ได้พิจารณาตามเอกสารกำกับยาและคำแนะนำจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รายละเอียดดังนี้

๓.๑ ผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป กำหนดให้วัคซีน จำนวน ๒ เข็ม ขนาด ๐.๕ ml. (๑๐๐ mcg.) โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ - ๑๒ สัปดาห์ และฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่ ๓ ขนาด ๐.๒๕ ml. (๕๐ mcg.) โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๒ ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป

๓.๒ ผู้ที่มีอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี กำหนดให้วัคซีน จำนวน ๒ เข็ม ขนาด ๐.๕ ml. (๑๐๐ mcg.)

โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ - ๑๒ สัปดาห์

๓.๓ ผู้ที่มีอายุ ๖ - ๑๑ ปี กำหนดให้วัคซีน จำนวน ๒ เข็ม ขนาด ๐.๒๕ ml. (๕๐ mcg.)

โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ - ๑๒ สัปดาห์

ทั้งนี้การบริหารจัดการวัคซีน Moderna ให้เป็นไปตามจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ในพื้นที่และคำนึงถึงวันหมดอายุของวัคซีนก่อนพิจารณาให้บริการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๙

สำเนาส่ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร