



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

แนวทางการรักษาอาการทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน

อาการทางระบบประสาทที่เกิดตามหลังการฉีดวัคซีน

Onset <24 hrs

Onset >24 hrs-30 days

อาการที่สงสัย **Immunization Stress-Related Response (ISRR)** ให้ **observe** อาการ

1. มีอาการชารอย่างเดี่ยว
2. Positive symptoms เช่น ปวด เสียว ชา หรือแปล็บ ๆ ตามแขนขา ชารรอบปาก
3. พูดไม้ซัดเพียงอย่างเดียว
4. Transient abnormal movement
5. ง่วง
6. อ่อนแรงแบบทั่ว ๆ หรืออ่อนเพลีย
7. มึนหรือเวียนศีรษะ
8. ตามัว

- ฝ้าสังเกตอาการจนกระทั่งคงที่หรือดีขึ้น
- ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยว่าอาการดังกล่าวมักจะหายได้เองภายใน 72 ชั่วโมง
- สามารถได้รับวัคซีนครั้งต่อไปตามกำหนดได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความยินยอมของผู้ป่วย แต่หากอาการดังกล่าวแย่ลงให้รีบปรึกษาแพทย์

Activate stroke fast track เมื่อมีอาการ

1. Hemiparesis MRC grading ≤ 3
2. NIHSS ≥ 4
3. NIHSS < 4 ร่วมกับ severe disable symptoms / clinical large vessel symptoms เช่น hemianopia, aphasia

ให้การรักษตาม stroke guideline หรือ
ปรึกษาประสาทแพทย์

พิจารณาเลื่อนหรืองดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

รายงานอาการไม่พึงไม่ประสงค์จากการฉีดวัคซีนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ doe_cd@ddc.mail.go.th

อาการที่เข้าได้กับอาการของโรคหลอดเลือดสมอง (stroke syndrome) หรือ มีอาการปวดศีรษะรุนแรง ชัก หรืออาการที่เข้าได้กับ thrombosis เช่น จำเลือดผิดปกติ หรือ อาการเจ็บแน่นหน้าอกร่วมด้วย

สงสัย VITT : CBC platelet < 150000 ,
Peripheral Blood Smear ปกติ

พิจารณาส่งตรวจและรักษา ตามคำแนะนำของ
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

สำหรับโรคทางระบบประสาทอื่นๆ เช่น
Acute Disseminated Encephalomyelitis (ADEM), Myelitis, Neuropathy หรือ Myopathy ให้รักษาตามมาตรฐานของโรคนั้น ๆ รักษา

Expert focal point รับปรึกษา

เขตสุขภาพ	แพทย์รับปรึกษา	หมายเลขโทรศัพท์
1,2,3	น.พ.สุรัตน์ ตันประเวช	083-203-2103
4,5	น.พ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา	086-999-4208
6,13	พ.ญ.อรอุมา ชูติเนตร	081-583-2014
7,8,9,10	น.พ. สมศักดิ์ เทียมเก่า	081-050-4626
11,12	พ.ญ.สุวรรณา เศรษฐวิชรานิช	081-598-2849
Standby ทุกเขตสุขภาพ	พ.ญ. ทศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์	062-246-6195

Key message

1. แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่จะได้รับวัคซีนถึงอาการทางระบบประสาทที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการฉีดวัคซีน
2. อาการที่เข้าได้กับ ISRR สามารถ observe อาการก่อนได้ เช่น อาการชาเพียงอย่างเดียว อาการ positive symptoms อาการปวดไม่ชัดหรือหน้าเบี้ยวเพียงอย่างเดียว ให้คำแนะนำผู้ที่ได้รับวัคซีนว่าอาการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้และมักจะหายไปตัวเองภายใน 72 ชั่วโมง
3. หากอาการทางระบบประสาทเป็น motor symptom ที่ MRC grade ≤ 3 หรือ NIHSS ≥ 4 หรือมี significant disability เช่น hemianopia หรือ aphasia ให้ activate stroke fast tract และให้การรักษาตาม stroke guideline
4. ปรึกษา Neurologist ตาม focal point stroke network และ รายงานอาการไม่พึงประสงค์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง