



**คำแนะนำการปฏิบัติกรกักตัวที่โรงพยาบาลสนาม**  
**สำหรับ ผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19)**  
**ဆေးရုံ၌ အသွားအလာကန့်သတ်ထားခြင်း အတွက်အကြံပြုချက်များ**  
**ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးရှိသည့်လူနာများအတွက်**

ผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาและกักตัวที่โรงพยาบาลสนาม 14 วัน แล้วไปพักฟื้นที่บ้านหรือสถานพักฟื้น ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย หรืออาการดีขึ้นแล้ว แต่เชื้อไวรัสที่ก่อโรคโควิด-19 อาจจะยังมีอยู่ในน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย ยาวนานอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจากเริ่มป่วย ดังนั้น ผู้ป่วยโควิด-19 ต้องกักตัวที่โรงพยาบาลสนาม 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มป่วย

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးရှိသူ အများစုဟာ ရောဂါလက္ခဏာများ မပြင်းထန်ပါ။ သို့ရာတွင် ဆေးရုံ၌ ၁၄ ရက် အသွားအလာကန့်သတ်ထားရှိရန် (ကွာရန်တင်းဝင်ရန်) လိုအပ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ မိုင်းရပ်စ်ဟာ ရောဂါလက္ခဏာ အနည်းငယ်သာရှိသောလူနာများ (သို့) ရောဂါသက်သာလာသော လူနာများ၏ တံတွေး (သို့) ခွဲများထဲတွင် ရောဂါစဖြစ်ပြီးနောက် အနည်းဆုံး ၁၄ ရက်ကြာသည်အထိ ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုလူနာများအနေဖြင့် ဖျားနာပြီးနောက် ဆေးရုံ၌နေစဉ်တွင် အနည်းဆုံး ၁၄ ရက် ကြာအောင် အခြားသူများနှင့် သီးခြားခွဲပြီးနေရန် လိုအပ်ပါသည်။



4. หากจำเป็นต้องเข้าไปใกล้ผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างอย่างน้อย 1 เมตร (ยกเว้นในกรณีที่เป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้ เนื่องจากไม่พบเชื้อในน้ำนม แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนสัมผัสหรือให้นมบุตร) หากไอจามไม่ควรเข้าไปใกล้ผู้อื่นหรืออยู่ห่างอย่างน้อย 2 เมตร

4. အခြားသူများနှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့ရန်လိုအပ်လျာပါက ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (mask) ကိုတပ်ဆင်ထားပါ။ အနည်းဆုံး ၁ မီတာ အကွာအဝေး ရှိရမည်ဖြစ်သည်။

5. หากไอจามขณะที่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ไม่ต้องเอามือมาปิดปาก เนื่องจากมืออาจเปราะเปื้อน หากไอจามขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยให้ใช้แขนหรือข้อศอกปิดปากจมูก

5. mask တပ်ထားစဉ်အတွင်း ချောင်းဆိုး၊ နှာချေစဉ် ပါးစပ်ကို လက်ဖြင့် ဖုံးမိပါက လက်များကို ညှစ်ပတ်စေနိုင်သောကြောင့် လက်ဖြင့် မဖုံးပါနှင့်။ အကယ်၍ mask မတပ်ထားမိစဉ် ချောင်းဆိုး၊ နှာချေပါက ပါးစပ်ကို လက်မောင်း (သို့) တံတောင်ဆစ်ဖြင့် ဖုံးပါ။

6. ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น หากจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกัน ให้ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำทำความสะอาดโดยสวมถุงมือหรือพื้นที่ที่อาจเปื้อนเสมหะ น้ำมูก อุจจาระ ปัสสาวะหรือสารคัดหลั่งด้วยน้ำและน้ำยาฟอกขาวโซเดียมไฮโปคลอไรด์เข้มข้น 0.5% (ผสมน้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำ 9 ส่วน)

6. အိမ်သာကို အခြားသူများနှင့် သီးသန့်ခွဲပြီးသုံးပါ။ အခြားသူများနှင့် မျှဝေသုံးစွဲရပါက အိမ်သာရေမဆွဲချမီ အိမ်သာ အဖုံးကိုအုပ်ပါ။ ခွဲများ၊ သလိပ်များ၊ ဝမ်း၊ ဆီး များပေကျံနေသော နေရာကို ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ပိုကလိုရိတ်အစွန်းချွတ်ဆေး ပြင်းအား ၀.၅ % ( အစွန်းချွတ်ဆေး ၁ဆ၊ ရေ ၉ ဆ ဖြင့်) သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမည်။

7. แยกสิ่งของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว โทรศัพทံ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

7. အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို သီးသန့်ထားပြီးသုံးပါ။ ပန်းကန်ခွက်ယောက်၊ ဇွန်း၊ ဖန်ခွက်၊ မျက်နှာသုတ်ပဝါ၊ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ စသည်တို့ကို အခြားသူများနှင့် မျှဝေသုံးစွဲခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။

8. ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น ควรให้ผู้อื่นจัดหามาให้แล้วแยกรับประทานคนเดียว

8. အခြားသူများနှင့် အတူတကွ စားသောက်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ သင့်အတွက်အစားအသောက်ကို တခြားသူက ပြင်ဆင်ပေးပါမည်။ လူနာက မိမိတစ်ယောက်တည်းသာ သီးသန့်စားသောက်ပါ။



ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရောဂါသည် ဒုတိယအပတ်အတွင်း ပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

13. ระหว่างการแยกตัว ทำความสะอาดเป็นประจำบริเวณพื้นที่ที่ผู้ป่วยพักหรือจับต้องและเครื่องเรือนเครื่องใช้ เช่น เติง โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัทพ์ ฯลฯ ด้วยน้ำและผงซักฟอกอย่างเหมาะสมกับวัสดุอุปกรณ์ ภายหลังครบกำหนดการแยกตัวข้างต้นให้ทำความสะอาดให้ทั่วถึงที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วยน้ำยาฟอกผ้าขาวโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น 0.5% ข้างต้น

13. အသွားအလာကန့်သတ်ထားစဉ်အတွင်း လူနာနားနေ/ကိုယ်တွယ်ထားသည့် နေရာများ၊ ပရိဘောဂပစ္စည်းများ (ဥပမာ-အိပ်ရာ၊ စားပွဲ၊ ထိုင်ခုံ၊ ဖုန်း) စသည်တို့ကို ရေနှင့်ဆပ်ပြာ (သို့) အရက်ပြန် ၇၀ % (သို့) သင့်တော်ရာဖြင့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ပိုကလိုရိတ် ၀.၀၅ % ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးကို သေချာစွာ တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပါ။



5. 'မိာ်ရဲးမိာ်ပိာ်ပိာ်အာ်အာ်နီၤ နီၤကွဲးကွဲးပိာ်ပိာ်အာ်အာ်နီၤ

5. အခြားသူများနှင့် အတူတကွ မစားသောက်ပါနှင့်။ တစ်ယောက်တည်း သီးသန့်စားသုံးပါ။

หากมีข้อสงสัยใดๆสามารถโทรสอบถามได้ที่ 099-446-8292 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

If you have any query, you can call at 099-446-8292 (24 hrs)

ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၉-၄၄၆-၈၂၉၂ သို့ (၂၄နာရီ) ဆက်သွယ်စုံစမ်း  
မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။