

# ประเด็นคำถาม กับการฉีดวัคซีน



1

**ถาม : กรณีเพิ่ง **แท้งบุตร**  
จะสามารถขอรับการฉีดโควิดได้หลังแท้งที่วัน**




**ตอบ : ภาวะแท้งบุตร  
ไม่เป็นข้อห้ามในการรับ  
วัคซีนโควิด สามารถรับวัคซีน  
ได้ทันทีเมื่อร่างกายแข็งแรง**

# 2

**ถาม :** ผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก  
อัมพาตครึ่งซีก จัดอยู่ใน **7 กลุ่มเสี่ยง** หรือไม่



**ตอบ :** โรคหัวใจและ  
หลอดเลือด ประกอบด้วยโรค  
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด  
และโรคหลอดเลือดสมอง(อัมพฤกษ์ อัมพาต)  
ดังนั้น เส้นเลือดในสมองแตก  
อัมพาตครึ่งซีก จึงจัดอยู่ใน  
**7 กลุ่มเสี่ยง**



ที่มา : กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

3

# ถาม : สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล ในการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ได้หรือไม่


**ตอบ** : สามารถเปลี่ยนสถานที่  
ฉีดวัคซีนได้กรณีจำเป็น เช่น กลับภูมิลำเนา  
โดยแจ้งได้เฉพาะโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์



4

**ถาม :** ต้องการ**บริจาคเลือด**  
ต้องรอกี่วัน หลังฉีดวัคซีนโควิด 19

**ตอบ :** 14 วัน



5

**ถาม :** การขอเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนเข็มสอง  
กรณีอยู่ระหว่างการกักตัว จะต้องทำอย่างไร  
ได้ลงทะเบียนไว้กับทางแอฟหมอพร้อม

**ตอบ :** สามารถติดต่อสถาน  
พยาบาลใกล้บ้าน หรือติดต่อศูนย์  
ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม  
โทร 0 2792 2333



# 6


**ถาม :** ฉีดวัคซีนโควิด 1 เข็มหลังจากนั้น  
**ติดโควิด** จะสามารถฉีดเข็ม 2 ได้เมื่อใด

**ตอบ :** อย่างน้อย 1-3 เดือน  
หลังจากตรวจพบเชื้อโควิด 19  
หรือหายดีและฟื้นระยะกักตัวแล้ว  
หรือหากหายเกิน 3 เดือน  
ให้ฉีดวัคซีนโดยเร็ว



# 7

**ถาม :** การฉีดวัคซีนแบบสลับไขว้  
หากได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็น Sinovac  
เข็มที่ 2 จะฉีดวัคซีน Sinopharm ได้หรือไม่



**ตอบ :** ขณะนี้มีนโยบายการให้วัคซีนสูตรไขว้  
คือ Sinovac เข็มที่ 1 และ AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2  
โดยมีระยะห่าง 3-4 สัปดาห์เป็นสูตรหลักในตอนนี้